

УДК 633.412:631.8:631.816.352:631.445.2(476.6)

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОМПЛЕКСНЫХ
УДОБРЕНИЙ ДЛЯ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
НА АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ**

Богушевич П.Т., Леонов Ф.Н.

УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

В комплексе факторов формирования урожая сельскохозяйственных культур и качества растениеводческой продукции решающее значение имеет сбалансированное питание растений всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Применение микроэлементов в системе удобрения сельскохозяйственных культур способствует повышению эффективности минеральных удобрений, прежде всего азотных. Потребность растений в микроэлементах и роль сбалансированного минерального питания возрастает в условиях интенсивных технологий, направленных на формирование высокопродуктивных посевов, поскольку при больших размерах выноса микроэлементов компенсации их с органическими и минеральными удобрениями практически не происходит [1, 2].

Микроэлементам принадлежит разнообразная агрохимическая и физиологическая роль, включающая участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах и др. В связи с тем, что каждый микроэлемент выполняет определенную функцию в

растении, недостаток каждого из них вызывает нарушения биохимических и физиологических процессов в растительных организмах, что приводит к получению низких и неполноценных по качеству урожаев [1, 2]. Поэтому в современных агротехнологиях применение микроудобрений под сельскохозяйственные культуры является обязательным научно обоснованным мероприятием при возделывании всех без исключения сельскохозяйственных культур, в том числе и свеклы столовой [2].

Перспективными формами удобрений являются комплексные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. В настоящее время республиканский рынок насыщен импортными комплексными удобрениями для некорневых подкормок. В то же время вопросы импортозамещения становятся все более актуальными. В последнее время отечественные производители предлагают ряд новых перспективных комплексных удобрений. Несомненный интерес в этом отношении представляют созданные в республике препараты Фитовитал и КомплеМет-Свекла, в состав которых входят макро- и микроэлементы в хелатной форме.

Сравнительное изучение эффективности применения отечественных (Фитовитал, КомплеМет-Свекла) и импортных (Эколист «Стандарт», Мультивит «Плюс», Мультивит «Универсал») комплексных удобрений для некорневых подкормок при возделывании свеклы столовой проводилось в 2010-2012 гг. в РУАП Гродненская овощная фабрика на среднеокультуренной агродерново-подзолистой супесчаной почве. Общая площадь делянки в опыте составляла 44,8 м², учетная 25,2 м², повторность в опыте четырехкратная. Расположение вариантов и повторений было систематическим, многорядным, ступенчатым. Технология возделывания свеклы столовой в полевом опыте осуществлялась в соответствии с отраслевыми регламентами. При возделывании свеклы столовой проводили трехкратную подкормку удобрениями для некорневых подкормок: Фитовиталом (2,0 л/га), КомплеМет-Свекла (2,0 л/га), Эколистом «Стандарт» (2,0 л/га), Мультивитом «Плюс» (2,0 л/га), Мультивитом «Универсал» (2,0 л/га) в фазу 8-10 листьев (19 стадия ВВСН), в фазу массового нарастания листового аппарата (35 стадия ВВСН) и в фазу начала интенсивного роста корнеплодов (39 стадия ВВСН). Удобрения вносили ранцевым опрыскивателем при расходе рабочего раствора 200 л/га.

Установлено, что применение минеральных удобрений N₉₀P₉₀K₁₂₀ увеличило урожайность корнеплодов свеклы столовой по сравнению с контролем в среднем за период исследований с 29,3 до 38,2 т/га, т.е. на 8,9 т/га (30,3%). Некорневые подкормки как импортными, так и отече-

ственными удобрениями для искорневых подкормок оказали положительное влияние на продуктивность культуры. Так, при трехкратном использовании Эколиста «Стандарт», Мультивита «Плюс» и Мультивита «Универсал» прибавка урожайности к фону составила соответственно 1.3, 0.9 и 2.2 т/га, т.е. 3.4, 2.4, 5.6% (табл.). При трехкратном внесении Фитовитала прибавка была еще выше и составила 3.2 т/га (8.4%). Среди всех удобрений для искорневых подкормок наибольшую достоверную прибавку к фону обеспечило трехкратное применение КомплеМет-Свекла, прибавка от применения которого составила 8.6 т/га, или 22.5%.

Таблица – Урожайность корнеплодов свеклы столовой, т/га (среднее за 2010-2012 гг.)

Вариант	Урожайность, т/га	Прибавка			
		к контролю т/га	%	к фону т/га	%
Без удобрений	29.3	-	-	-	-
$N_{90}P_{90}K_{120}$ - фон	38.2	8.9	30.3	-	-
Фон + Эколист «Стандарт»	39.5	10.2	34.8	1.3	3.4
Фон + Мультивит «Плюс»	39.1	9.8	33.4	0.9	2.3
Фон + Мультивит «Универсал»	40.4	11.1	37.9	2.2	5.7
Фон + Фитовитал	41.4	12.1	41.3	3.2	8.4
Фон + КомплеМет-Свекла	46.8	17.5	59.7	8.6	22.5
ПСР ₀₅	1.7				

Проведенные исследования показали высокую агрономическую эффективность изучаемых комплексных удобрений для искорневых подкормок. Установлено, что отечественные комплексы макро-микроэлементов по эффективности не уступают импортным аналогам, что с точки зрения импортозамещения свидетельствует об актуальности их дальнейшего изучения.

ЛИТЕРАТУРА

- Микроэлементы в сельском хозяйстве : 2-е изд., дополненное. – Д. Днепрокнига, 2003. – 80 с.
- Система применения микроудобрений под сельскохозяйственные культуры : рекомендации / РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси». – Минск, 2006. – 28 с.