

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ

Казыро А.М., Маланко В.В.

УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Проблемой современного скотоводства является рождение и выращивание функционально недостаточно зрелых телят (телят-гипотрофиков). Под гипотрофией понимают длительное хроническое страдание, сопровождающееся нарушением трофической функции организма. Экономические потери от данной патологии складываются из гибели молодняка, замедления роста, потерь племенных качеств, ухудшения качества мяса животных и снижения окупаемости кормов [1].

Кровь является источником всех жидкостей, секретов и экскретов организма. Морфологические, биохимические и гематологические показатели крови связаны с ростом, развитием и продуктивными качествами сельскохозяйственных животных. Кровь, являясь внутренней средой для всех органов и тканей, наиболее полно отражает в себе разнообразные физиологические процессы, происходящие в организме. Картина крови очень информативно отражает состояние гомеостаза, функциональную полноценность организма и его адаптивные возможности [2].

Минеральные вещества принимают активное участие во всех видах обмена веществ (белковом, углеводном, жировом, водном и др.) Пороговые концентрации для каждого микроэлемента относительны. Они могут повышаться и понижаться в зависимости от вида, животного, их биологического состояния, сезонности и других факторов [4].

Витамины не являются для организма поставщиками энергии и не имеют существенного пластического значения. Однако они играют каталитическую роль, входя в состав ферментов и даже ферментных систем, являющихся специфическими регуляторами биохимических реакций, происходящих в организме. В период интенсивного роста и развития молодняка потребность в неорганических веществах и витаминах возрастает в 1,5-2 раза. Ряд веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности, не обладает способностью синтезироваться в организме, эти вещества должны поступать регулярно с кормом в организм [3].

Следовательно, необходимо создать полноценные условия содержания и кормления, которые позволят корректировать процессы мета-

болизма в организме молодняка сельскохозяйственных животных, что является актуальным вопросом для повышения жизнеспособности и сохранности телят с пониженной живой массой при рождении.

Целью нашей работы является анализ гематологических и биохимических показателей крови телят-гипотрофиков; определение фармакологических свойств витаминно-минеральной добавки «Кормовой фосфолипидный комплекс» для телят – Т 2 в качестве дополнительного источника питательных веществ и лечебно-профилактического влияния при желудочно-кишечных заболеваниях.

Исследования проводились на базе УО СПК «Путришки» Гродненского района. Для проведения опытов было сформировано две группы телят (контрольная и опытная) по 25 голов в каждой группе. Живая масса телят при рождении составляла $20,6-25 \pm 0,2$ кг (телята-гипотрофики). Опытные животные дополнительно к основному рациону получали по 15-20,0 г на голову в сутки кормового фосфолипидного комплекса для телят – Т 2 на протяжении 2 месяцев. Контрольная группа препаратов не получала.

Было организовано взятие крови в начале и в конце опыта. Кровь брали из яремной вены с соблюдением правил асептики и антисептики.

При проведении гематологических и биохимических исследований крови было установлено увеличение содержания эритроцитов, где этот показатель в контроле составил $6,09 \pm 0,17 \cdot 10^{12}$, в опыте – $7,00 \pm 0,05 \cdot 10^{12}$ (выше на 14,94% $P < 0,001$), гемоглобина в контроле – $96,00 \pm 0,83$ г/л, в опыте – $107,84 \pm 0,77$ г/л (выше на 12,33% $P < 0,001$). Содержание железа в контрольной группе составило $16,97 \pm 0,26$ мкмоль/л, в опытной – $19,40 \pm 0,18$ мкмоль/л (выше на 14,31%, $P < 0,05$), кальция – $2,47 \pm 0,01$ ммоль/л и $2,81 \pm 0,09$ ммоль/л (выше на 13,76 %, $P < 0,001$), концентрация фосфора в сыворотке крови увеличилась на 20,45% по сравнению с контрольной группой, калия – на 25,91%, содержание альбуминов и γ -глобулинов выше на 11,03% и 13,45% соответственно. Содержание лейкоцитов в опытной группе было в пределах физиологической нормы ($7,36 - 8,07 \times 10^9$).

На протяжении проведения опыта в контрольной группе заболело 7 животных, что составляет 28%, в данной группе пало 2 головы, в опытной группе заболело 3 теленка. Падежа среди опытной группы не наблюдалось. Выздоровление телят опытной группы происходило на 4-й день.

Благодаря своим фармакологическим свойствам, обусловленных входящими в состав комплекса витаминов, микро- и макроэлементов, ферментов, фосфолипидов рапса, использование витаминно-минеральной добавки позволяет нормализовать процессы метаболизма, повы-

сить прирост живой массы, адаптировать пищеварительную систему и гомеостаз, что является актуальным для телят с пониженной живой массой при рождении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карпуть, И.М. Возрастные и приобретенные иммунные дефициты / И.М. Карпуть // Ветеринарная медицина Беларуси. - 2001. - №2. - С. 28-31.
2. Медведева, М.А. Клиническая лабораторная диагностика. Справочник для ветеринарных врачей / М.А. Медведева - М.: «Аквариум - Принт», 2009.-416 с.
3. Малашко, В.В. Витамины. Симптоматика гиповитаминозов. Витаминотерапия. Серия «Биология теленка». Выпуск № 2. / В.В. Малашко, Дм. В. Малашко, Д. В. Малашко, - Гродно, 2010.-186 с.
4. Малашко, В.В. Минеральные вещества. Симптоматика макро - и микроэлементозов. Минералотерапия. Серия «Биология теленка». Выпуск № 3. / В.В. Малашко, Дм. В. Малашко, Д. В. Малашко. - Гродно: ГГАУ, 2011.-128 с.